

Raadplegingen

De raadplegingen van de dienst algemene en abdominale heekunde vinden plaats in onze medische centra in Tienen en Aarschot. Via onderstaande telefoonnummers kan u een afspraak maken.

Medisch Centrum Tienen: (t) 016 80 95 82

Medisch centrum Aarschot: (t) 016 55 17 11

RZ Heilig Hart Tienen

Campus Mariëndal

Kliniekstraat 45 • 3300 Tienen
(t) 016 80 90 11

Campus St.-Jan

Houtemstraat 115 • 3300 Tienen
(t) 016 80 95 00

Medisch Centrum Aarschot

Langdorpssteenweg 129 • 3200 Aarschot
(t) 016 55 17 11

www.rztienen.be



Abdominale heekunde
Anale kanker

Wat is anale kanker?

Kanker wordt gekenmerkt door een ongecontroleerde groei van lichaamseigen cellen veroorzaakt door een mutatie van hun genetisch materiaal. Deze groei start lokaal en kan uitbreiden via de lymfevaten naar de lymfeklieren en via de bloedbaan naar andere organen.

Anale kanker vertegenwoordigt ongeveer 2% van alle maagdarmkankers. De kanker situeert zich in of net buiten de anus en ontstaat in het slijmvlies van de aars (*adenocarcinoom*) of de huid rond de anus (*squameuscel carcinoom*).

Frequent wordt de associatie gemaakt met het *humaan papillomavirus*, dat anale wratten veroorzaakt. Ook volgende factoren kunnen het kankerrisico vergroten: roken, chronisch lokale ontsteking, bestraling op het bekken, onderdrukking van het immuunsysteem (medicatie, HIV) en anale seksuele betrekkingen.

Hoe ontdekken we anale kanker?

We kunnen anale kanker vroegtijdig opsporen door de symptomen die het veroorzaakt. Deze zijn anaal bloedverlies, pijn, jeuk, verandering van het stoelgangspatroon, slijmverlies en het gevoel van een massa aan de aars.

Ter bevestiging nemen we een biopsie om het weefsel microscopisch te onderzoeken. Aangezien uitbreiding naar de lymfeklieren in de lies mogelijk is, moeten deze ook worden nagekeken.

Behandeling

Kleine tumoren kunnen we soms verwijderen met een lokale operatie. Voor grotere kankers gaat de voorkeur uit naar een combinatie van chemotherapie en bestraling van de aars.

Indien na deze zware behandeling herval optreedt, dan is het verwijderen van de aars met aanleggen van een kunstmatige anus (stoma) noodzakelijk (*abdominoperineale rectumamputatie*).

Een vroegtijdig herkende tumor leidt dus tot een betere uitkomst. Laat symptomen niet aanslepen, maar raadpleeg uw arts.
