

Raadplegingen

De raadplegingen van de dienst algemene en abdominale heekunde vinden plaats in onze medische centra in Tienen en Aarschot. Via onderstaande telefoonnummers kan u een afspraak maken.

Medisch Centrum Tienen: (t) 016 80 95 82

Medisch centrum Aarschot: (t) 016 55 17 11

RZ Heilig Hart Tienen

Campus Mariëndal

Kliniekstraat 45 • 3300 Tienen
(t) 016 80 90 11

Campus St.-Jan

Houtemstraat 115 • 3300 Tienen
(t) 016 80 95 00

Medisch Centrum Aarschot

Langdorpsesteenweg 129 • 3200 Aarschot
(t) 016 55 17 11

www.rztienen.be



Abdominale heekunde
Speen
Aambeien

Wat is speen?


De termen speen, aambeien, hemorroïden beschrijven allemaal eenzelfde veel voorkomend anaal probleem, nl. dat van spataders aan de anus.

Spataders in en net buiten de aars zijn eigenlijk heel normaal. Men kan ze vergelijken met kussentjes die ervoor zorgen dat de de anus goed wordt afgesloten en dus de continentie ondersteunen.

Ze kunnen echter ook voor problemen zorgen.

- **Externe spataders** kunnen verstoppen (trombose). Hierbij zet een bloedklonter zich vast, wat zorgt voor een pijnlijke, harde knobbel aan de buitenzijde van de anus.
- **Interne spataders** kunnen opzwellen en een pijnloze bloeding veroorzaken. Bij het maken van stoelgang puilen ze naar buiten uit.

De meest frequente symptomen zijn pijn, zwelling, en bloeding. Ook jeuk en slijmverlies kunnen optreden.



Moet speen behandeld worden?

Alleen wanneer speen hinderlijk is en klachten veroorzaakt, moet het behandeld worden.

Een conservatieve behandeling met vezelrijke voeding, zitbaden, aanbrengen van zalf en inname van pijnstillers kan veel milde symptomen verhelpen.

Bij een pijnlijke, harde externe trombose moet de bloedklonter verwijderd worden. Dit kan door het insnijden of wegsnijden van de verstopte spatader.

Bij bloedende interne spataders hangt de behandeling af van de uitgebreidheid.

Onderstaande behandelingen worden uitgevoerd in functie van de toenemende grootte van het speen:

- **scleroseren, droogspuiten:** op de raadpleging zonder narcose
- **rubberband ligatuur, afbinden met een elastiekje:** op de raadpleging zonder narcose
- **hemorrhoidectomie, wegsnijden:** in de operatiezaal onder algemene narcose
- **hemorrhoidopexie, opnieten:** in de operatiezaal onder algemene narcose

Een chirurgische behandeling van speen gaat gepaard met wisselende pijnklachten na de operatie. Lokale verzorging en tijdelijke werkongeschiktheid zijn vereist gedurende enkele weken.

Kan speen leiden tot kanker?

Speen leidt niet tot kanker. Wees wel voorzichtig! Bloedverlies kan wel een alarmsymptoom van kanker zijn en moet zonder uitstel worden nagekeken.

