

Aanvraag medische beeldvorming: RX-echografie-CT

OPGELET 1) Eén aanvraagformulier per klinische vraagstelling is vereist 2) **Rood** is verplicht in te vullen

IDENTIFICATIE VAN PATIËNT: INVULLEN OF STROOKJE V.I.

Naam & voorna(a)m (en):

Geboortedatum:

Geslacht: V M

Adres:

.....

AANVRAGENDE ARTS:

Stempel (naam, voornaam, adres, Riziv-nr):

Datum: / / 20..... Handtekening:

VOORGESTELDE ONDERZOEKEN

SKELET

Schedel

- Schedel
- Orbitae
- Neus
- OPG (max 1/jaar)
- Tele schedel
- Mandibula
- Kaakgewrichten

Wervelzuil & bekken

- CWZ
- DWZ
- LWZ
- Sacrum - coccyx
- SIG
- Bekken
- Bekken liniaal
- Full spine (statiek)

Thoraxwand

- Ribbenrooster R - L
- Sternum

Ledematen

- Vinger R - L
- Hand R - L
- Pols R - L
- Onderarm R - L
- Elleboog R - L
- Bovenarm R - L
- Schouder R - L
- Scapula R - L
- Clavicula R - L
- Teen R - L
- Voet R - L
- Enkel R - L
- Onderbeen R - L
- Knie R - L
- Femur R - L
- Heup R - L
- Lengtemeting OL
- Full leg (statiek)
- Botleeftijd
- Distentie-arthrografie schouder R - L

PNEUMOLOGIE

- Thorax F / P

ORL

- Sinussen
- Cavum nasi
- RX HWD

GASTRO-ENTEROLOGIE

- ERCP
- Abdomen enkel L/S
- Slikfunctie
- Slokdarm
- SMD
- Dundarmtransit
- Colon enkel
- Colon dubbel contrast
- Gastric banding
- Colpo-cystodefaecografie

UROLOGIE

- NSE/BSE
- IVP
- Retrograde cystografie + permict
- Cystografie (postop)

GYNAECOLOGIE

- Hysterografie
- Screeningsmammografie (50-69 jr, 2-jrks, zonder echogr.)
- Diagnostische mammografie (zo nodig: echogr.)
- Stereotaxie/biopsie/reperage met specificatie van
- target :
- beeldvorming:

ECHOGRAFIE

- Hals / Schildklier
- Speekselklieren
- Borsten
- Lever/galblaas/pancreas
- Bovenbuik
- Nieren en blaas
- Klein bekken/fossa
- Prostaat transrectaal

- Scrotum
- Lidmaat

KLEURENDOPPLER

- Halsvaten
- Abdominale vaten
- Arterieel lidmaat
- Veneus lidmaat

CT-SCAN

- Schedel
- Rotsbeenderen
- Sinussen/MFM
- Orbitae
- Hals
- Thorax
- HRCT longvelden
- Bovenbuik
- Onderbuik
- Virtuele colon (bij onmogelijke optische coloscopie)
- Uro
- CWZ discus:
- DWZ discus:
- LWZ
- Dental CT
- Arthro CT
- Bekken bot
- Muskuloskeletaal, specificeer:

ANGIO CT

- Circulus van Willis
- Cervicale carotiden
- Longembolen
- Ao thoracalis
- Ao abdominalis
- Aa renales
- Aorta-iliacaal-OL

INFILTRATIES

- Schouder
- Heup

ANDERE:

.....

- onderzoek aan bed
- patiënt in rolstoel
- patiënt besmet

RELEVANTE BIJKOMENDE INLICHTINGEN

1. **Vrouwelijke patiënt:**
zwanger? Ja Nee
2. **Implantaten? Welke?**
.....
.....
3. **Indien onderzoek (mogelijk) met contraststof:**
Allergie contraststof? Ja Nee
Andere allergie? Ja Nee
Zo ja, welke?
.....
Nierinsufficiëntie? Ja Nee
Zo ja: waarde + datum
laatste crea? .. / .. / 20 ..
laatste GFR? .. / .. / 20 ..
Diabetes? Ja Nee
CVA of hartinfarct < 6 maanden? Ja Nee
Hyperthyroïdie? Ja Nee
Betablokker? Ja Nee
4. **Indien biopsie**
Anticoagulatie? Ja Nee
5. **Andere relevante gegevens?**
.....
.....

VORIGE RELEVANTE ONDERZOEKEN I.V.M. DIAGNOSTISCHE VRAAGSTELLING

- CT MRI RX Echo Andere: Onbekend

RELEVANTE KLINISCHE INLICHTINGEN :

.....
.....
.....

DIAGNOSTISCHE VRAAGSTELLING :

.....
.....
.....

Vorbereidingschema radiologische onderzoeken

RX SMD OF DUNDARMTRANSIT

- Vanaf 4 uur voor het onderzoek: volledig nuchter blijven (ook: niet roken).
- 3 dagen voor het onderzoek stoppen met anticholinergica en radio-opake farmaca.

COLON DUBBELCONTRAST

3 dagen voor het onderzoek

- Restenarme (vezelarme) voeding: mager vlees, vis, kaas, toast, wit brood.
- Geen groenten of fruit, geen grof brood.
- Iedere dag anderhalve liter water of thee.

De avond voor het onderzoek

- Uitsluitend vloeibaar voedsel: water, appelsap, bouillon, thee of koffie zonder melk.
- Een half uur voor het avondeten: Prepacol®-vloeistof oplossen in een half glas water en opdrinken.
- Voor het slapengaan de 4 Prepacol®-tabletten uit het doosje innemen.

RX IVP

- Vanaf 4 uur voor het onderzoek: volledig nuchter blijven (ook: niet roken)

RX MAMMOGRAFIE

- Onderzoek gedurende eerste 10 dagen na begin van de menstruatie
- Hormonale substitutietherapie vermelden bij klinische inlichtingen.
- Vroegere mammografische of echografische onderzoeken meebrengen.
- Screeningsmammografie:
 - ✓ vrouwen tussen 50 en 69 jaar, maximaal 2-jaarlijks, geen enkel bijkomend onderzoek;
 - ✓ tweede lezing & resultaat na ± 4 weken, nadien zo nodig bijkomende onderzoeken (ook mogelijk in MCA).

RX BOTLEEFTIJD / VERWACHTE VOLWASSEN LENGTE

Nodige gegevens (indien mogelijk): huidige lengte, lengte 1 jaar geleden, ev. botleeftijd 1 jaar geleden, leeftijd van menarche.

ECHOGRAFIE BOVENBUIK

Vanaf 4 uur voor het onderzoek: volledig nuchter blijven (ook niet roken).

ECHOGRAFIE NIEREN & BLAAS OF KLEIN BEKKEN

- Volle blaas
- Evaluatie endometrium en ovaria: onderzoek gedurende eerste 10 dagen na begin van menstruatie.

DISTENTIE-ARTHOGRAFIE SCHOUDER

Lichte sedatie voor het onderzoek en intensieve kiné onmiddellijk erna voorzien.

CT-ONDERZOEK MET IV-CONTRAST

Vanaf minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (ook: niet roken).

CT ONDERBUIK EN ABDOMEN OVERZICHT

- Vanaf minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (ook: niet roken).
- Minstens 1 uur voor het onderzoek perorale voorbereiding met verdunde Gastrografine®-oplossing.

CT VIRTUELE COLONOGRAFIE (ALLEEN AANVRAGEN BIJ ONMOGELIJKE OPTISCHE COLOSCOPIE)

Speciale voorbereiding noodzakelijk (inlichtingen secretariaat radiologie)

BIOPSIE ONDER GELEIDE VAN BEELDFORMING (ECHOGRAFIE OF CT)

- Aspirine® en andere salicylaten alsook NSAID: stop 10 dagen vóór biopsie.
- Marcoumar®/coumarinderivaten: min. 5 dagen vóór onderzoek stoppen daarna controle PT(T)/Quick: > 60 %
- Thrombocyten: > 70.000/ mm³.
- Hartkleproblemen: aangepaste AB-voorbereiding cf. endocarditis profylaxe.